

### P-6. La sensibilidad materna como factor de protección en el desarrollo del pretérmino

MT. Asensi Monzó<sup>a</sup>, A. D'Ocón Giménez<sup>b</sup>, S. Simó-Teufel<sup>b</sup>, D. Banacloche<sup>b</sup>, S. Borraz Gracia<sup>c</sup>, M. Andrés Celma<sup>c</sup>

<sup>a</sup>CS Serrería 1. <sup>b</sup>Departamento de Psicología Básica. Facultad de Psicología. Universidad de Valencia.

<sup>c</sup>Servicio de Pediatría. Sección de Neurología Infantil. Hospital Clínico Universitario. Valencia. España.

**Introducción y objetivos.** Los estudios indican que la prematuridad constituye un factor de vulnerabilidad asociado a problemas cognitivos, atencionales y de regulación emocional. Otros estudios indican que los contextos de crianza sensibles potencian el desarrollo y la adaptación socioemocional del bebé. El objetivo es identificar si la sensibilidad materna amortigua las diferencias en los patrones de desarrollo observados en los bebés en función del riesgo perinatal: a término (AT), pretérmino (PT) con peso al nacer > 1500 g (PT1) y con peso al nacer < 1500 g (PT2).

**Métodos.** Se realizan valoraciones a 53 lactantes: 18 AT, 17 PT1 y 18 PT2, en relación al índice de desarrollo (área de adaptación, psicomotricidad, lenguaje y psicosocial), al patrón tem-

peramental y a la calidad del patrón interaccional madre-hijo y del vínculo afectivo hacia el cuidador principal.

#### Resultados

- Efecto de la sensibilidad materna y la prematuridad en los índices de desarrollo del niño. Los bebés PT que crecen en contextos de crianza altamente sensibles se desarrollan óptimamente, alcanzando índices de desarrollo similares a los de los niños AT.
- Efecto de la sensibilidad materna y la prematuridad en el temperamento infantil. Los niños PT que se desarrollan en contextos sensibles presentan un tono emocional más positivo, mayor placer en la situación, menos apatía, una organización psicomotora más flexible y organizada y una sensibilidad perceptiva más adaptada.
- Efecto de la sensibilidad materna y la prematuridad en el patrón de apego. La sensibilidad materna favorece el desarrollo de un apego seguro, independientemente de la edad al nacer.

**Conclusiones.** El nacimiento prematuro se considera un factor de vulnerabilidad del bebé, que se puede ver mitigado o amortiguado por el efecto de la sensibilidad materna. Los bebés PT que se de-

sarrollan en contextos de crianza sensibles alcanzan niveles de desarrollo similares a los de los niños AT.

### **P-7. Situación actual del manejo del asma en Pediatría de Atención Primaria en la Comunidad Valenciana**

P. Barona Zamora<sup>a</sup>, MT. Asensi Monzó<sup>b</sup>, I. Úbeda Sansano<sup>c</sup>, C. Sánchez Medina<sup>d</sup>, T. Álvarez de Laviada Mulero<sup>e</sup>, E. Fabregat Ferrer<sup>f</sup>, M. Ramos Gracia<sup>g</sup>

<sup>a</sup>CS Padre Jofré. Valencia.

<sup>b</sup>CS Serrería 1. Valencia. <sup>c</sup>CS de

La Eliana. Valencia. <sup>d</sup>Consultorio Auxiliar de Albalat de la Ribera.

Valencia. <sup>e</sup>Consultorio Auxiliar Barrio de la Luz. Valencia. <sup>f</sup>CS Gran Vía.

Castellón. <sup>g</sup>CS Beniopa. Gandía, Valencia. España.

**Introducción y objetivos.** El ámbito ideal para el manejo del asma infantil es la Atención Primaria (AP). Los programas de asistencia integral han demostrado su eficacia en el asma. Por ello, es necesario que pediatras y enfermeras de AP tengan una formación adecuada y dispongan de los recursos apropiados. El objetivo es valorar el manejo del asma y los recursos disponibles en AP en la Comunidad Valenciana.

**Material y métodos.** Analizar mediante encuestas autocumplimentadas los recursos disponibles para el manejo del asma en Pediatría. La encuesta se facilitó a los asistentes de tres talleres de asma impartidos por el Grupo de Vías Respiratorias de la Asociación Va-